



9-Борабицикло[3.3.1]нонан, димер

CAS № 21205-91-4

Химическая формула: $C_{16}H_{30}B_2$

Молярная масса: 244.04

Физические свойства:

Белый порошок или кристаллы.

Насыпная масса: 400-500 г/л.

Температура плавления: 152-156 °С.

Растворимость в ТГФ: 0.58 моль/л при 25 °С.

Растворимость в гексане: 0.50 моль/л при 25 °С.

Растворимость в хлороформе: 1.00 моль/л при 25 °С.

Применение:

- Региоселективное гидроборирование алкенов.
- Гидроборирование алкинов, диенов, алленов и нитрилов.
- Восстановление кетонов, эфиров и третичных амидов до спиртов, α,β -ненасыщенных альдегидов и кетонов до соответствующих аллильных спиртов.
- Функционализация полимеров.
- Получение стереоселективных восстанавливающих агентов: *B*-изопинокамфеил-9-ББН, *B*-изопинокамфеил-9-борабицикло[3.3.1]нонил гидрид лития и других.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



9-Борабицикло[3.3.1]нонан, димер

Спецификация:

Внешний вид	Белый порошок или кристаллы
Содержание основного вещества	98.0 % мин

По вопросам приобретения 9-Борабицикло[3.3.1]нонан, димер и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов