



АЛКОЛИД НИКОТИНА 99%, БИТАРТАРТ НИКОТИНА, ПОЛАКРИЛЕКС НИКОТИНА USP 15%

АЛКОЛИД НИКОТИНА 99%

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Никотин алкалоид 99%	
КАС №	54-11-5
Формула	C10H14N2
Описание	Бесцветная или бледно-желтая жидкость с запахом пиридина
Содержание никотина	99,5%
Содержание воды	0,5% Максимальная
Тяжелые металлы	0,002% Максимальный
Удельный вес	1,00925
pH	9.8 € «10,0
Показатель преломления	1,5282
Температура кипения	С 247Еš
Хроматографическое Чистота	Соответствует USP Std.
Растворимость	Смешивается с водой и растворителями в пропорции всех
Упаковка	5/10/20/50 кг Барабан азота.

БИТАРТАРТ НИКОТИНА

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АЛКОЛИД НИКОТИНА 99%, БИТАРТАРТ НИКОТИНА, ПОЛАКРИЛЕКС НИКОТИНА USP 15%

Типовые характеристики

Категория: АФИ
С.А.С. код: 65-31-6
Фармакологическое действие: Лечение никотиновой зависимости
Доступность: доступен
Фармакопея: USP/EP
Документация:

ПОЛАКРИЛЕКС НИКОТИНА USP 15%

Никотин является полакрилекс форма никотина найти в устной продуктов, используемых, чтобы помочь людям бросить курить. Никотин связывается с смолы в этих продуктах, чтобы облегчить регулируемым высвобождением и помощь в абсорбции через слизистые оболочки в полости рта. Используется в качестве направлены, эти продукты могут обеспечить средства для облегчения симптомов отмены никотина и преодолеть пристрастие к курению. Эти продукты имеют некоторые риски и побочные эффекты, но может быть намного меньше, чем риск для здоровья, связанных с продолжением курить. Продукты, содержащие никотин полакрилекс наиболее часто принимают форму жевательной резинки или иногда леденцы и продаются под различными торговыми названиями. Когда человек перестает курить, он или она, как правило, испытывает ряд неприятные симптомы вывода, и в некоторых случаях эти симптомы достаточно надоедливым, что человек возвращается к сигаретам. Никотин полакрилекс может помочь человеку сделку с вывода, обеспечивая источник замены никотина, без других опасных последствий для здоровья от курения. Дозировка никотиновой полакрилекс варьируется для каждого человека, и, как правило, зависит от степени вредной привычкой человека. Есть чаще два доступных дозировки, один для легких

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АЛКОЛИД НИКОТИНА 99%, БИТАРТАРТ НИКОТИНА, ПОЛАКРИЛЕКС НИКОТИНА USP 15%

курильщиков, которые курят меньше, чем 25 сигарет в день и более высокую дозировку для тяжелых курильщиков. Обычно человек жуёт кусок резинки каждый раз, когда он или она испытывает сигарет тягу. Никотин полакрилекс резинка используется по-разному от обычного резинки. Он медленно жевал, пока не покалывание или сильный вкус, а затем помещается между десен жующего и щеки до тех пор, вкусовых ощущений или исчезает, или для половины часа. Как человек испытывает тягу меньше, они постепенно должны жевать резинку меньше. Таким образом, лицо, желающее, чтобы бросить курить медленно отлучает от никотина привычку с меньшим количеством симптомов абстиненции. Резинки, как правило, используется в течение примерно трех месяцев. Пользователи должны следовать инструкциям на упаковке. Есть некоторые случаи, когда человек не должен использовать никотина полакрилекс, например, если они беременны или если они по-прежнему курить. Перед использованием этого продукта, человек должен обсудить его или ее медицинской истории с врачом, в том числе любые другие лекарства или добавки принимаются. Легкие побочные эффекты никотина полакрилекс может включать изжога, тошнота, тошнота, стоматологических проблем, и рот или челюсть боль. Более серьезные побочные эффекты, которые требуют медицинской помощи может включать в себя рвоту, слабость, головокружение, нерегулярные или ненормальное сердцебиение или признаки аллергической реакции, как крапивница, отек, или затрудненное дыхание.

По вопросам приобретения продукции: **алколид никотина 99%, битартарт никотина, полакрилекс никотина usp 15%** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов