



Бутадиен (1,3-бутадиен) — ненасыщенное органическое соединение.

Структурная формула $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$

Эмпирическая формула C_4H_6 .

При нормальных условиях бутадиен — бесцветный газ с характерным запахом, в 1,92 раза тяжелее воздуха (масса 1 литра газообразного бутадиена 2,48 г).
технологический бутадиен цех полимеризация

Жидкий бутадиен представляет собой бесцветную, прозрачную, легкоподвижную жидкость. Температура кипения его при 760мм рт.ст. составляет минус 4,5°C. Температура плавления бутадиена равна минус 108,9°C.

Бутадиен плохо растворим в воде (при 20°C — порядка 0,09%). Хорошо растворим в этиловом спирте, эфире и других полярных растворителях.

По вопросам приобретения Бутадиен и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов