



трет-Бутиламин-боран

CAS № 7337-45-3

Химическая формула: $(\text{CH}_3)_3\text{CNH}_2:\text{BH}$

Молярная масса: 86.97

Физические свойства:

Белый порошок или кристаллы.

Температура плавления: 97-98 °С.

Растворимость в воде: 20 г/л при 20 °С.

Насыпной вес: 300-400 г/л.

Применение:

- Восстанавливающий агент при получении оптически активных спиртов.
- Для получения фотоотверждаемых композиций, используемых при получении литографических плат.
- В цветной фотографии.
- Восстанавливающий агент для конверсии аристеромицина в цикларادين.
- Для стереоселективного восстановления стероидных кетонов.
- При нанесении медных покрытий при изготовлении печатных плат.
- Восстанавливает альдегиды, образующиеся *in situ* при гидролизе ацеталей трифторметансульфоновой кислотой в ТГФ, до первичных спиртов.
- Восстанавливает еноны с получением аллильных спиртов.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



трет-Бутиламин-боран

Спецификация:

Содержание основного вещества	98.0 % мин
Внешний вид	Белый порошок или кристаллы
Температура плавления	97°С мин (разложение)

По вопросам приобретения трет-Бутиламин-боран и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов